

Bilaga 1. Tillstånd och faktorer som inte medför en förhöjd infektionsrisk

Faktor/tillstånd	Kommentar	Risk-viktning
Astma	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Infektioner som medför astmaexacerbation är oftast orsakade av virus och/eller bakterier i luftvägarna.	0
Ateroskleros	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Bypassopererad	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Central venkateter (CVK)	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Den ökade risk för infektioner som föreligger är vanligtvis orsakad av hudbakterier.	0
Diabetes utan komplikationer	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Dialysbehandling	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
HIV	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Hjärtarytmier	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0

Hjärtinfarkt	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Kranskärls-sjukdom	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
KOL	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Ledprotes	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan är inte associerade med ledprotesinfektioner och medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Antibiotikaprofylax inför invasiva ingrepp förebygger inte ledprotesinfektioner.	0
Missbruk alkohol/narkotika	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Denna patientgrupp har ökad risk för vissa bakteriella infektioner men ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. För patienter med dålig oral hälsa, se tabell 1.	0
Mjukvävnads-implantat (bröstimplantat och övriga estetiska implantat)	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. De infektioner som kan uppstå sker vanligtvis postoperativt orsakade av hudbakterier.	0
Neurologisk sjukdom (till exempel MS, Parkinson, ALS)	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Njursvikt	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Risk för infektion föreligger framför allt av bakterier som orsakar urinvägsinfektioner och/eller luftvägsinfektioner.	0
Pacemaker	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Infektioner är ovanliga och är oftast korrelerade till	0

	implantationen av pacemakern och orsakas i förekommande fall framför allt av tarm- eller hudbakterier.	
Perifer venkateter (PVK)	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Infektioner är relativt vanliga men orsakas oftast av hudbakterier.	0
Reumatisk sjukdom	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Patienter med reumatologiska sjukdomar och immundämpande antireumatisk terapi inklusive biologiska läkemedel är i normalfallet inte i behov av antibiotikaprofylax vid tandvård.	0
Shunt vid hydrocefalus	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Sickelcellanemi	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung. Risk för infektion föreligger framför allt av bakterier vilka orsakar luftvägsinfektioner.	0
Splenektomerad	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner av bakterier med oralt ursprung. Risk för infektion föreligger framför allt av kapslade bakterier vilka orsakar luftvägsinfektioner.	0
Stent i kranskärl	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Strålbehandling < 30 Gy mot käkbenet	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva och /eller benskadande ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för käkbensnekroser.	0
Tumör (solid) – utan påverkan på blodbild	Antibiotikaprofylax ej indicerat. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0

Övervikt (BMI ≥ 25–40)	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0
Övervikt, grav (BMI > 40)	Antibiotikaprofylax ej indicerad. Invasiva ingrepp i munhålan medför ingen ökad risk för infektioner orsakade av bakterier med oralt ursprung.	0