

Till dig som medicinerar med metformin

Metformin är förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes, har en god blodsockersänkande effekt och förebygger diabeteskomplikationer. Metformin finns i flera olika kombinationsläkemedel

Ditt läkemedel heter: _____

Viktigt att känna till om metformin

Vid vätskebrist finns risk för mjölksyraförgiftning (laktacidosis) av metformin. Risken ökar vid hög ålder eller vid nedsatt njurfunktion.

I följande risksituationer för vätskebrist ska du tillfälligt pausa behandlingen:

- Ökade vätskeförluster, exempelvis vid kräkningar och diarréer, eller vid feber.
- Bristande vätskeintag, det vill säga att du av någon anledning inte dricker när du är törstig.

Vid tveksamhet kontakta din vårdcentral eller diabetesmottagning eller 1177.

Röntgenundersökningar med kontrastmedel

- Vissa kontrastmedel kan ge nedsatt njurfunktion som ökar risken för mjölksyraförgiftning vid metforminbehandling.
- Beroende på vilket kontrastmedel som används måste i vissa fall behandling med Metformin tillfälligt avbrytas inför röntgenundersökning

Om du ska göra en röntgenundersökning med kontrastmedel ska du kontakta röntgenundersökande enhet för besked om du skall pausa metforminbehandlingen.

Plats för egna anteckningar

.....
.....
.....