

Tecken på allvarlig infektion hos barn

Vital-parameter	Låg risk Grönt ljus	Medelhög risk Gult ljus – ett symtom räcker, flera symtom innebär högre risk	Hög risk Rött ljus – ett symtom räcker för bedömning hög risk										
Allmäntillstånd	Barnet: - svarar normalt på sociala signaler - är alert eller lättväckt - är nöjt eller ler - skriker starkt och normalt eller inte alls.	Barnet: - svarar inte normalt på sociala signaler - är vaken men trött och hängig - har nedsatt aktivitetsnivå - är väldigt missnöjt.	Barnet: - reagerar inte på undersökningen - vaknar inte eller väcks men somnar igen - gnyr eller skriker svagt, gällt eller kontinuerligt - är allvarligt sjukt enligt föräldrarna eller läkares bedömning/intuition.										
Kroppstemperatur	Afebril eller feber som inte uppfyller gult eller rött ljus.	- Spädbarn 3–6 månader med feber $\geq 39,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. - Barn med feber i > 5 dagar.	- Spädbarn < 3 månader med feber $\geq 38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. - Barn i alla åldrar med feber $> 41,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. - Spädbarn < 1 år med temperatur $< 36,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (hypotermi).										
Andningsfrekvens (andetag/minut)	Normal andning.	<table><tr><td>< 2 mån</td><td>> 60</td></tr><tr><td>2–12 mån</td><td>> 50</td></tr><tr><td>1–2 år</td><td>> 40</td></tr><tr><td>3–5 år</td><td>> 35</td></tr><tr><td>≥ 6 år</td><td>> 30</td></tr></table>	< 2 mån	> 60	2–12 mån	> 50	1–2 år	> 40	3–5 år	> 35	≥ 6 år	> 30	- takypné (> 60) - kvidande eller gnyende andning ("grunting") - kraftiga indragningar.
< 2 mån	> 60												
2–12 mån	> 50												
1–2 år	> 40												
3–5 år	> 35												
≥ 6 år	> 30												
Hjärtfrekvens (hjärtslag/minut)	Normal hjärtfrekvens.	<table><tr><td>< 1 år</td><td>> 160</td></tr><tr><td>1–2 år</td><td>> 150</td></tr><tr><td>2–5 år</td><td>> 140</td></tr></table> Tillfällig takykardi är vanligt vid skrik, oro eller feber hos barnet.	< 1 år	> 160	1–2 år	> 150	2–5 år	> 140	Ihållande takykardi. Ihållande takykardi kan vara tecken på septisk chock, myokardit, hypovolemi eller smärta.				
< 1 år	> 160												
1–2 år	> 150												
2–5 år	> 140												
Handläggning	Barnet kan åka hem med allmänna råd och vid behov behandling.	- Barnet kan åka hem med säkerhetsnät eller bedömas akut på sjukhus. Samråd gärna med barnläkare. - Säkerhetsnät innebär information om förväntat sjukdomsförlopp, vilka symtom som bör observeras och när vården bör kontaktas igen. - Planera för uppföljning.	Barnet bör bedömas akut på sjukhus i de flesta fall.										