

Uppföljning av vårdförlopp

Vårdförloppets mål och åtgärder följs upp genom resultat- och processmått vilket skapar förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Befintliga källor för uppföljning ska användas i den mån det går, men målsättningen på längre sikt är att oavsett vilken källa som används för uppföljning, ska strukturerad vårddokumentation utgöra grunden. Det innebär också att uppföljning av vårdförloppen, i så stor utsträckning som är möjligt, ska baseras på information som är relevant för patienten och vården.

I nästa avsnitt sammanfattas vårdförloppets nuvarande datatillgång och uppföljningsmöjligheter. För att förverkliga uppföljningen av vårdförloppet kommer ytterligare arbete krävas, såväl nationellt gemensamt som regionalt och lokalt.

Tillgång till data och uppföljningsmöjligheter

Resultat- och processmåttarna är valda för att svara mot angivna utmaningar och mål för patienter som genomgår åtgärder i primärvården för ländryggsvärta och/eller relaterade bensymtom.

Indikatorerna är valda för att spegla patientrapporterade resultat, processtider, information till patienten och kvalitetsresultat. I möjligaste mån har indikatorer valts där data kan hämtas från kvalitetsregister. För några av indikatorerna saknas idag andra datakällor än lokala vårdinformationssystem. När data för de aktuella indikatorerna framöver samlats in från regionerna, kommer resultatet att publiceras på SKR:s webbsida [Vården i siffror](#).

Indikatorer för uppföljning

Vårdförloppets indikatorer visas i tabell 1 och 2. För detaljerad information om hur indikatorerna beräknas hänvisas till webbplatsen [Kvalitetsindikatorkatalog](#) där kompletta specifikationer publiceras i takt med att de är genomarbetade. Där beskrivs och motiveras också de valda indikatorerna.

Indikatorerna redovisas könsuppdelat och totalt och för både region- och enhetsnivå när det är möjligt och relevant.

Tabell 1. Resultatmått

Indikator	Prioritet
Andel patienter med ländryggsbesvär som har en Nationell patientenkät dimensionspoäng över 70% gällande kunskap om sitt hälsotillstånd	Hög
Andel patienter med ländryggsbesvär som har en Nationell patientenkät dimensionspoäng över 70% gällande kontinuitet och koordinering	
Andel patienter med ländryggsbesvär som har en Nationell patientenkät dimensionspoäng över 70% gällande delaktighet	
Andel patienter med ländryggsbesvär som fått minskad smärta skattat enligt NRS/VAS efter grundbehandling	Hög

Tabell 2. Processmått

Indikator	Prioritet
Genomsnittligt antal sjukpenningdagar per år för patient med ländryggsbesvär som fått behandling	
Årlig genomsnittlig sjukvårdskostnad för patienter med ländryggsbesvär	
Andel patienter med ländryggsbesvär som får bedömning inom 3 dagar efter första kontakt	
Andel patienter med ländryggsbesvär som får riskbedömning baserad på Start Back Screening Tool eller ÖMPSQ-kort	Hög
Andel patienter med ländryggsbesvär som genomgått grundbehandling före utredning med bilddiagnostik	
Andel patienter med ländryggsbesvär som genomgått grundbehandling före beslut om remiss till specialiserad vård inom ortopedi	