

Bilaga - Wifl gradering

Wound (Sår/Klinisk kategori)

GRAD	SÅR	GANGRÄN
0	Inget sår	Inget gangrän
Klinisk beskrivning: ischemisk vilovärk (symtom + ischemi grad 3: ankeltryck <50 mmHg eller tå-tryck <30 mmHg).		
1	Små, ytliga sår distalt på underben eller fot; inget exponerat ben, förutom om det är begränsat till distal falang	Inget gangrän
Klinisk beskrivning: mindre vävnadsförlust. Foten går att rädda med enkel tå-amputation (1 eller 2 tår) eller hud-täckning.		
2	Djupare sår med exponerat ben, led eller sena; vanligen inte innefattande häl; ytligt hälsår, utan engagemang av calcaneus	Gangrän begränsat till tår
Klinisk beskrivning: större vävnadsförlust. Foten går att rädda med multipla (≥3) tå-amputationer eller standard transmetatarsal amputation ± täckning med hud.		
3	Extensivt, djupt sår som innefattar framfoten och/eller mellanfoten; djupt hälsår, genom alla mjukdelar ± engagemang av calcaneus	Extensivt gangrän
Klinisk beskrivning: extensiv vävnadsförlust som enbart går att rädda med komplex fotrekonstruktion; täckning med lambå eller komplex sårvård som vid stora mjukdelsdefekter.		

Grad 0 (inget sår)

Grad 1 (mild)

Grad 2 (moderat)

Grad 3 (svår)

Ischemi

GRAD	ABI	ANKELTRYCK	TÅ-TRYCK
0	≥0.80	>100 mm Hg	≥60 mm Hg
1	0.6-0.79	70-100 mm Hg	40-59 mm Hg
2	0.4-0.59	50-70 mm Hg	30-39 mm Hg
3	≤0.39	<50 mm Hg	<30 mm Hg

Grad 0 (ingen ischemi)

Grad 1 (mild)

Grad 2 (moderat)

Grad 3 (svår)

Fotinfektion

GRAD	KLINISK MANIFESTATION	IDSA/PEDIS INFECTION SEVERITY
0	Inga symtom eller tecken på infektion	Ej infekterat
1	<p>Infektion, definierat som minst 2 av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokal svullnad eller induration • Erytem >0.5 till ≤2 cm runt såret • Lokal ömhet eller smärta • Lokal värmeökning • Pus (tjock, grå till vit, eller blodtillblandad sekretion) <p>Lokal infektion som engagerar enbart hud och subkutis (utan engagemang av djupare vävnader och utan systempåverkan; se nedan). Uteslut andra orsaker till inflammation i huden (t ex trauma, gikt, akut Charcot neuro-osteopati, fraktur, trombos, venös stas)</p>	Mild
2	Lokal infektion (som beskrivet ovan) med erytem > 2 cm, eller engagemang av strukturer djupare än subkutis (t ex abscess, osteomyelit, septisk artrit, fasciit), och utan systempåverkan; se nedan	Moderat
3	<p>Lokal infektion (som beskrivet ovan) med tecken på systempåverkan (SIRS) med två eller fler av följande^a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur >38° or <36°C • Hjärtfrekvens >90 slag/min • Andningsfrekvens >20 andetag/min eller PaCO₂ < 4 kPa • Vita blodkroppar (LPK) >12 eller <4 eller >10 procent omogna former 	Svår

PaCO₂, Partialtryck för koldioxid; SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome

^aIschemi kan komplicera och öka svårighetsgraden vid infektion. Systemisk infektion går ibland med andra kliniska fynd, såsom hypotension, konfusion, kräkningar, eller tecken på metabola störningar, såsom acidosis, svår hyperglykemi, ny-debuterad ketonemi.

Grad 0 (ingen infektion)

Grad 1 (mild)

Grad 2 (moderat)

Grad 3 (svår)