

Tecken på allvarlig infektion hos barn

	Låg risk Grönt ljus	Medelhög risk Gult ljus – ett symptom räcker, flera symptom innebär högre risk	Hög risk Rött ljus – ett symptom räcker för bedömning hög risk										
Allmäntillstånd	Barnet <ul style="list-style-type: none"> • svarar normalt på sociala signaler • är alert eller lättväckt • är nöjt eller ler • skriker starkt och normalt eller inte alls. 	Barnet <ul style="list-style-type: none"> • svarar inte normalt på sociala signaler • är vaken men trött och hängig • har nedsatt aktivitetsnivå • är väldigt missnöjt. 	Barnet <ul style="list-style-type: none"> • reagerar inte på undersökningen • vaknar inte eller väcks men somnar igen • gnyr eller skriker svagt, gällt eller kontinuerligt • är allvarligt sjukt enligt föräldrarna eller läkares bedömning/intuition. 										
Kroppstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Afebril eller feber som inte uppfyller gult eller rött ljus 	<ul style="list-style-type: none"> • Spädbarn 3–6 månader med feber $\geq 39,0$ °C • Barn med feber i > 5 dagar 	<ul style="list-style-type: none"> • Spädbarn < 3 månader med feber $\geq 38,0$ °C • Barn i alla åldrar med feber > 41,0 °C • Spädbarn < 1 år med temperatur < 36,0 °C (hypotermi) 										
Andningsfrekvens (andetag/minut)	<ul style="list-style-type: none"> • Normal andning 	<table> <tr> <td>< 2 mån</td> <td>> 60</td> </tr> <tr> <td>2–12 mån</td> <td>> 50</td> </tr> <tr> <td>1–2 år</td> <td>> 40</td> </tr> <tr> <td>3–5 år</td> <td>> 35</td> </tr> <tr> <td>≥ 6 år</td> <td>> 30</td> </tr> </table>	< 2 mån	> 60	2–12 mån	> 50	1–2 år	> 40	3–5 år	> 35	≥ 6 år	> 30	<ul style="list-style-type: none"> • Takypné (> 60) • Kvidande eller gnyende andning ("grunting") • Kraftiga indragningar
< 2 mån	> 60												
2–12 mån	> 50												
1–2 år	> 40												
3–5 år	> 35												
≥ 6 år	> 30												
Hjärtfrekvens (hjärtslag/minut)	<ul style="list-style-type: none"> • Normal hjärtfrekvens 	<table> <tr> <td>< 1 år</td> <td>> 160</td> </tr> <tr> <td>1–2 år</td> <td>> 150</td> </tr> <tr> <td>2–5 år</td> <td>> 140</td> </tr> </table> <p>Tillfällig takykardi är vanligt vid skrik, oro eller feber hos barnet.</p>	< 1 år	> 160	1–2 år	> 150	2–5 år	> 140	<ul style="list-style-type: none"> • Ihållande takykardi 				
< 1 år	> 160												
1–2 år	> 150												
2–5 år	> 140												
Handläggning	<ul style="list-style-type: none"> • Barnet kan åka hem med allmänna råd och vid behov behandling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barnet kan åka hem med säkerhetsnät eller bedömas akut på sjukhus. Samråd gärna med barnläkare. • Säkerhetsnät – informera om förväntat sjukdomsförlopp, vilka symptom som bör observeras och när vården bör kontaktas igen. • Planera för uppföljning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barnet bör bedömas akut på sjukhus i de flesta fall. 										