

Grund för rekommendation

Rekommendation Periorbital nekrotiserande fasciit baseras på följande underlag

Rekommendationen baseras på vetenskapliga studier och underlag som beskriver internationell konsensus. Referenser till dessa finns löpande i kunskapsunderlaget.

Beskrivning av vad som vägts in när rekommendationen togs fram

Denna riktlinje har utarbetats av NPO ögonsjukdomars nationella arbetsgrupp (NAG) för Plastik/orbita. I den nationella arbetsgruppen har ingått representanter från alla sex sjukvårdsregioner.

Patientrepresentant har inte funnits med i den nationella arbetsgruppen. Ingen patientförening finns för aktuellt område. I den öppna remissrundan gavs möjlighet för patientrepresentanter att lämna synpunkter.

Den nationella arbetsgruppen inventerade initialt befintliga kunskapsstöd inom regionerna. Det fanns inget nationellt kunskapsstöd men ett antal regionala kunskapsstöd med nästan identiskt innehåll. Arbetsgruppen har också eftersökt nationella kunskapsstöd via Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi samt infektionsläkarföreningen. Några sådana fanns inte. En systematisk sökning av internationell litteratur inom området gjordes med hjälp av sökmotorn Pubmed. Några randomiserade studier finns inte inom området utan kunskapsstödet baseras på fallstudier och översiktsartiklar.

Hela arbetsgruppen för plastik/orbita har granskat riktlinjen och kommit fram till detta konsensusdokument. I brist på randomiserade studier baseras riktlinjen på det publicerade material som finns och arbetsgruppens samlade erfarenhet. Syftet att basera riktlinjerna på vetenskap har nåtts så långt det varit möjligt.